

課題名	21. ナシ輪紋病防除薬剤																														
成果の概要	<p>ルミライト水和剤1,000倍、バイコラール水和剤1,500倍は対照薬剤のダイホルタン水和剤、トモオキシラン水和剤に比べ、同等の効果を示した。薬害は両薬剤とも認められなかった。</p>																														
成績概要	<p style="text-align: center;">ナシの輪紋病防除薬剤の検討</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">区</th> <th style="width: 35%;">薬 剤 名</th> <th style="width: 15%;">調 査 枝 数</th> <th style="width: 15%;">い ぼ 数 a)</th> <th style="width: 30%;">薬 害</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ルミライト水和剤1,000倍</td> <td>50</td> <td>5.3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>バイコラール水和剤1,500倍</td> <td>50</td> <td>3.2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ダイホルタン水和剤1,000倍</td> <td>50</td> <td>3.8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トモオキシラン水和剤 600倍</td> <td>50</td> <td>7.5</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>無 散 布</td> <td>50</td> <td>31.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">a) 1枝当たりの病斑数</p>	区	薬 剤 名	調 査 枝 数	い ぼ 数 a)	薬 害	1	ルミライト水和剤1,000倍	50	5.3	—	2	バイコラール水和剤1,500倍	50	3.2	—	3	ダイホルタン水和剤1,000倍	50	3.8	—	4	トモオキシラン水和剤 600倍	50	7.5	—	5	無 散 布	50	31.0	
区	薬 剤 名	調 査 枝 数	い ぼ 数 a)	薬 害																											
1	ルミライト水和剤1,000倍	50	5.3	—																											
2	バイコラール水和剤1,500倍	50	3.2	—																											
3	ダイホルタン水和剤1,000倍	50	3.8	—																											
4	トモオキシラン水和剤 600倍	50	7.5	—																											
5	無 散 布	50	31.0																												

成

績

概

要

(果樹試験場)

普及上の留意点