

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
諫早市	諫早	100	住	2015	8471	0.020	0.114	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2016	8719	0.021	0.110	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2017	8733	0.020	0.107	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2018	8746	0.017	0.149	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2019	7019	0.015	0.080	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
島原市	島原	100	未	2015	8755	0.023	0.105	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2016	8693	0.025	0.102	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2017	8718	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2018	8723	0.022	0.114	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2019	8737	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
大村市	大村	100	住	2015	8763	0.024	0.113	0	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2016	8692	0.026	0.099	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2017	8734	0.024	0.136	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2018	8738	0.023	0.116	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2019	8736	0.022	0.077	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
川棚町	川棚	100	未	2015	8758	0.023	0.102	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2016	8721	0.022	0.101	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2017	8738	0.022	0.129	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2018	8716	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2019	8733	0.019	0.102	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
時津町	時津小学校	100	住	2015	8740	0.021	0.200	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2016	8707	0.021	0.153	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2017	8728	0.017	0.182	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2018	8715	0.018	0.131	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2019	8524	0.017	0.141	0	0.0	0	0.0	0.036		ベータ線吸収法
西海市	雪浦	100	未	2015	8557	0.021	0.146	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2016	8723	0.021	0.124	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2017	8729	0.020	0.125	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2018	8721	0.020	0.124	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2019	8701	0.018	0.195	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
松浦市	松浦志佐	100	住	2015	8759	0.022	0.132	0	0.0	0	0.0	0.053		ベータ線吸収法
				2016	8700	0.020	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2017	8719	0.017	0.144	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8699	0.017	0.116	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2019	8722	0.018	0.149	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
対馬市	対馬	100	住	2015	8752	0.020	0.124	0	0.0	0	0.0	0.055		ベータ線吸収法
				2016	8743	0.020	0.149	0	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2017	8715	0.019	0.135	0	0.0	1	0.3	0.045		ベータ線吸収法
				2018	8739	0.019	0.093	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2019	8746	0.017	0.094	0	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
壱岐市	壱岐	100	未	2015	8682	0.024	0.148	0	0.0	0	0.0	0.055		ベータ線吸収法
				2016	8676	0.023	0.146	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2017	8724	0.023	0.203	1	0.0	1	0.3	0.053		ベータ線吸収法
				2018	8736	0.024	0.114	0	0.0	0	0.0	0.054		ベータ線吸収法
				2019	8751	0.020	0.101	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
五島市	五島	100	商	2015	8755	0.018	0.094	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2016	8717	0.019	0.129	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2017	8729	0.018	0.094	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2018	8709	0.017	0.131	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2019	4482	0.015	0.095	0	0.0	0	0.0	0.030		ベータ線吸収法
雲仙市	小浜	100	未	2015	8756	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
				2016	8711	0.020	0.109	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2017	8702	0.019	0.106	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2018	8737	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2019	8640	0.020	0.087	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2015	8761	0.021	0.107	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2016	8624	0.019	0.174	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
				2017	8704	0.019	0.144	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8720	0.019	0.120	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2019	8766	0.017	0.137	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2015	8668	0.018	0.109	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2016	8705	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2017	8730	0.018	0.117	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2018	8704	0.018	0.105	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2019	8740	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
長崎市	長崎駅前	91	商	2015	8747	0.027	0.113	0	0.0	0	0.0	0.050		ベータ線吸収法
				2016	8734	0.022	0.093	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2017	8729	0.021	0.120	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2018	8729	0.020	0.095	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2019	8769	0.018	0.095	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
長崎市	村松	100	未	2015	8754	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2016	8733	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2017	8661	0.020	0.121	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2018	8734	0.019	0.097	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2019	8719	0.017	0.079	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法
長崎市	東長崎支所	91	商	2015	8762	0.026	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2016	8570	0.026	0.093	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2017	8739	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2018	8718	0.016	0.136	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法
				2019	8763	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0.032		ベータ線吸収法
長崎市	中央橋	91	商	2015	8754	0.025	0.137	0	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2016	8735	0.024	0.131	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2017	8730	0.023	0.130	0	0.0	0	0.0	0.050		ベータ線吸収法
				2018	8553	0.022	0.160	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2019	7898	0.019	0.086	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2015	8683	0.028	0.102	0	0.0	0	0.0	0.056		ベータ線吸収法
				2016	8738	0.027	0.114	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2017	8691	0.026	0.143	0	0.0	0	0.0	0.053		ベータ線吸収法
				2018	8670	0.023	0.100	0	0.0	0	0.0	0.050		ベータ線吸収法
				2019	8768	0.017	0.087	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
佐世保市	相浦	92	商	2015	3679	0.030	0.104	0	0.0	0	0.0	0.052		ベータ線吸収法
佐世保市	早岐	92	商	2015	3677	0.029	0.127	0	0.0	0	0.0	0.052		ベータ線吸収法
佐世保市	大塔	92	準工	2015	7879	0.020	0.108	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2016	8736	0.020	0.097	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2017	8723	0.018	0.101	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2018	8726	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
				2019	8759	0.015	0.090	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
佐世保市	吉井	100	未	2015	8770	0.022	0.125	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2016	8748	0.018	0.087	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2017	8745	0.018	0.118	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8682	0.018	0.088	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2019	8750	0.016	0.098	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2015	8694	0.019	0.138	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2016	8407	0.019	0.109	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2017	8735	0.018	0.121	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2018	8666	0.017	0.092	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
佐世保市	石岳	92	未	2015	8724	0.019	0.119	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2016	8706	0.021	0.116	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2017	8735	0.020	0.120	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2018	8712	0.018	0.132	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
佐世保市	袖木	92	未	2015	8700	0.020	0.132	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2016	8734	0.019	0.146	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2017	8687	0.018	0.148	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2018	8728	0.017	0.132	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
佐世保市	世知原	100	未	2015	8714	0.019	0.103	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2016	8684	0.017	0.093	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2017	8714	0.017	0.112	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8689	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2019	8738	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐世保市	小佐々	100	未	2015	8708	0.021	0.117	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2016	8731	0.021	0.104	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2017	8687	0.019	0.138	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2018	8720	0.017	0.095	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
佐々町	木場	100	住	2015	8724	0.022	0.113	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2016	8720	0.018	0.096	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2017	8690	0.017	0.125	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2018	8711	0.017	0.096	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2019	8697	0.015	0.087	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
松浦市	御厨	100	他	2015	8714	0.019	0.118	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2016	8707	0.018	0.143	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2017	8713	0.016	0.115	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8679	0.016	0.107	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2019	8745	0.015	0.100	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
松浦市	上志佐	100	住	2015	8715	0.022	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2016	8710	0.017	0.092	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2017	8691	0.016	0.109	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2018	8711	0.016	0.102	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2019	8682	0.014	0.095	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
松浦市	今福	100	住	2015	8690	0.022	0.108	0	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2016	8684	0.018	0.097	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2017	8715	0.017	0.136	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2018	8691	0.016	0.090	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2019	8744	0.015	0.096	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐世保市	江迎	100	住	2015	8680	0.019	0.115	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2016	8712	0.018	0.087	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2017	8687	0.016	0.110	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8708	0.015	0.099	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2019	8711	0.014	0.092	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐世保市	鹿町	100	未	2015	8685	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2016	8702	0.019	0.226	1	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2017	8666	0.018	0.118	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2018	8708	0.018	0.104	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2019	8630	0.015	0.104	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
松浦市	鷹島	100	住	2015	8696	0.022	0.109	0	0.0	0	0.0	0.051		ベータ線吸収法
				2016	8709	0.020	0.096	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2017	8698	0.018	0.123	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2018	8686	0.018	0.110	0	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2019	8742	0.016	0.086	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
平戸市	平戸	100	住	2015	8686	0.022	0.110	0	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2016	8715	0.020	0.116	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2017	8685	0.018	0.130	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2018	8713	0.019	0.105	0	0.0	0	0.0	0.049		ベータ線吸収法
				2019	8708	0.016	0.098	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
平戸市	紐差	100	住	2015	8708	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.050		ベータ線吸収法
				2016	8706	0.019	0.119	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2017	8685	0.017	0.123	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2018	8704	0.018	0.111	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2019	8684	0.016	0.089	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
南島原市	口之津	100	臨港	2015	8713	0.022	0.117	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2016	8702	0.025	0.128	0	0.0	0	0.0	0.055		ベータ線吸収法
				2017	8689	0.023	0.202	1	0.0	0	0.0	0.064		ベータ線吸収法
				2018	8699	0.022	0.161	0	0.0	1	0.3	0.045		ベータ線吸収法
				2019	8697	0.021	0.160	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
長崎市	三重檜山	91	未	2015	8710	0.021	0.106	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2016	8649	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2017	8639	0.020	0.123	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2018	8674	0.021	0.137	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2019	8645	0.020	0.108	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
長崎市	黒崎中学校	100	未	2015	8672	0.021	0.141	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2016	8653	0.022	0.083	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2017	8653	0.021	0.091	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
				2018	8642	0.021	0.105	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2019	8638	0.019	0.078	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
長崎市	神浦	100	未	2015	8689	0.018	0.096	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2016	8679	0.018	0.313	10	0.1	1	0.3	0.042		ベータ線吸収法
				2017	8677	0.018	0.129	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8661	0.018	0.101	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2019	8671	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0.036		ベータ線吸収法
西海市	遠見岳	100	未	2015	8711	0.019	0.099	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2016	8681	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2017	8676	0.019	0.097	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8688	0.019	0.089	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2019	8664	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
西海市	伊佐浦	100	未	2015	8733	0.019	0.096	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2016	8652	0.019	0.124	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
				2017	8315	0.018	0.091	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
				2018	8626	0.018	0.088	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2019	8679	0.018	0.210	1	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
西海市	面高	100	未	2015	8734	0.023	0.164	0	0.0	0	0.0	0.048		ベータ線吸収法
				2016	8653	0.024	0.311	2	0.0	0	0.0	0.046		ベータ線吸収法
				2017	8631	0.022	0.105	0	0.0	0	0.0	0.045		ベータ線吸収法
				2018	8637	0.022	0.134	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
				2019	8664	0.022	0.153	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法

## 2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無)	
西海市	大小島	100	未	2015	8653	0.019	0.095	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
				2016	8676	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
				2017	8657	0.019	0.096	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
				2018	8627	0.019	0.121	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
				2019	8697	0.018	0.084	0	0.0	0	0.0	0.036		ベータ線吸収法