

3) 巡回調査成績

(1) 稲

早期水稻

調査時期			葉いもち				紋枯病				ばか苗病				萎縮病			
年	月	期	調査	発生	発病株率		調査	発生	発病株率		調査	発生	発病株率		調査	発生	発病株率	
			圃場数	圃場率	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均
94	04	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	05	前	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0
	06	後	72	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0
	06	前	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0
	07	後	49	55.1	100	26.2	49	4.1	4	0.1	49	6.1	4	0.1	49	0	0	0
	07	前	12	58.3	100	24	12	75	76	23	12	0	0	0	12	0	0	0
	08	後	33	27.3	30	1.6	33	57.6	92	12.8	33	0	0	0	33	0	0	0
	08	前	15	0	0	0	15	80	90	40.8	15	0	0	0	15	0	0	0
	08	後	1	0	0	0	1	100	0.02	0.02	1	0	0	0	1	0	0	0

調査時期			稲葉枯病				白葉枯病				こま葉枯病				穂いもち					
年	月	期	調査	発生	発病株率		調査	発生	発病株率		調査	発生	発病株率		調査	発生	発病株率		発病株率	
			圃場数	圃場率	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均	最高	平均
94	04	後	12	0	0	0	12	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05	前	18	0	0	0	18	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06	後	72	0	0	0	72	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06	前	7	0	0	0	7	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	後	49	0	0	0	49	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	前	12	0	0	0	12	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08	後	33	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0
	08	前	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	15	6.7	6	0.4	0.3	0.02
	08	後	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100	0.2	0.2	0.1	0.1

調査時期			もみ枯病						ツマゲロヨコバイ									
年	月	期	調査	発生	発病株率		発病率		調査	発生	寄生株率		成虫		幼虫		合計	
			圃場数	圃場率	最高	平均	最高	平均	圃場数	圃場率	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
94	04	後	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	前	-	-	-	-	-	-	18	11.1	4.0	0.3	0.04	0.004	0	0	0.04	0.004
	06	後	-	-	-	-	-	-	72	4.2	8	0.2	0	0	0.08	0.08	0.08	0.08
	06	前	-	-	-	-	-	-	7	100	4	4	0.04	0.03	0.04	0.01	0.04	0.02
	07	後	-	-	-	-	-	-	49	30.6	32	2.2	0.3	0.02	0.8	0.03	0.9	0.05
	07	前	-	-	-	-	-	-	12	4	0.2	0.03	0.2	0.04	0.1	0.01	0.3	0.04
	08	後	33	0	0	0	0	0	33	18.2	40	2.9	0.2	0.001	0.6	0.02	0.6	0.03
	08	前	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	後	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			セジロウンカ									
年	月	期	調査	発生	寄生株率		成虫		幼虫		合計	
			圃場数	圃場率	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
94	04	後	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	前	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	後	72	2.8	1	0.02	0.01	0.0002	0	0	0.01	0.0002
	06	前	7	42.9	1	0.4	0.04	0.02	0	0	0.04	0.02
	07	後	49	40.8	60	5	0.8	0.05	0.5	0.03	0.8	0.08
	07	前	12	16.7	4	0.7	0.04	0.003	0.04	0.003	0.04	0.007
	08	後	33	21.2	32	3.2	0.2	0.01	0.4	0.03	0.6	0.04
	08	前	15	6.7	32	2.1	0	0	0.4	0.03	0.4	0.03
	08	後	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			トビイロウンカ											
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生株率		成虫		幼虫		合計		短翅率	
					最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
94	04	後	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		前	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		後	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	06	前	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		後	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	07	前	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		後	33	18.2	20	1.8	0.2	0.01	0.3	0.01	0.3	0.02	70	70
	08	前	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		後	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

調査時期			ヒメトビウンカ										コブノメイガ							
年	月	期	調 査	発 生	寄生株率		成 虫		幼 虫		合 計		調 査	発 生	被害葉 発 生	食害株率		10㎡当り成虫数		
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	圃場数	圃場率	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	
94	04	後	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
		前	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	
		後	72	2.8	3	0.06	0.03	0.0005	0	0	0.03	0.0005	72	0	0	0	0	0	0	
	06	前	7	57.1	8	1.6	0.08	0.03	0	0	0.08	0.03	7	0	0	0	0	0	0	
		後	49	4.1	2	0.05	0.02	0.006	0	0	0.02	0.006	49	26.5	4.1	2	0.06	2	0.3	
	07	前	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16.7	100	44	18.3	2	0.3	
		後	33	3	8	0.2	0.08	0.002	0	0	0.08	0.002	33	24.2	63.6	40	7.2	5	0.7	
	08	前	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
		後	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

調査時期			カメムシ類				イネミズゾウムシ								イネゾウムシ			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	20回振り成虫数		調 査 圃場数	発 生 圃場率	被害葉 発 生 圃場率	食害株率		株当成虫数		調 査 圃場数	発 生 圃場率	食害株率		
					最 高	平 均				最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	
34	04	後	-	-	-	-	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
		前	-	-	-	-	18	44	83	100	34	0.4	0.07	18	0	0	0	
	06	後	-	-	-	-	72	47	93	100	34.7	1.2	0.06	72	8.3	10	0.4	
		前	-	-	-	-	7	42.9	57	40	17.3	0.1	0.04	7	0	0	0	
	07	後	-	-	-	-	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	
		前	-	-	-	-	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
	08	後	33	12.1	4	0.2	33	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	
		前	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	
		後	1	100	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

調査時期			ニカメイガ				イネヨトウ				アワヨトウ				イネクロカメムシ							
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	食害株率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	食害株率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	株当寄生虫数		調 査 圃場数	発 生 圃場率	寄生株率		株当寄生虫数			
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
94	04	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0		
		前	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0		
		後	72	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0		
	06	前	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0		
		後	49	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0		
	07	前	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0		
		後	33	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0		
	08	前	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0		
		後	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

普通期水稻

調査時期			葉いもち				紋枯病				ばか苗病				萎縮病			
年	月	期	調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	前後	117	4.3	8	0.1	117	0	0	0	117	0	0	0	117	0	0	0
	08	前後	70	38.6	100	11.6	70	2.9	2	0.06	70	0	0	0	70	0	0	0
	09	前後	103	57.3	100	25.8	103	8.7	24	0.6	103	0	0	0	103	0	0	0
	10	前後	57	40.3	44	5.4	57	43.9	76	4.7	57	0	0	0	57	0	0	0
	11	前後	105	14.3	54	2.2	105	14.3	54	2.2	105	0	0	0	105	0	0	0
	12	前後	32	6.3	100	3.1	32	31.3	52	5.1	32	0	0	0	-	-	-	-
	01	前後	99	1	0.02	0.0002	99	0	0	0	99	0	0	0	-	-	-	-
	02	前後	21	4.7	1	0.05	21	66.7	40	9.2	21	0	0	0	-	-	-	-

調査時期			縮葉枯病				白葉枯病				黄化萎縮病				黄萎病			
年	月	期	調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均
94	06	前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	後	117	0	0	0	117	0	0	0	117	0	0	0	117	0	0	0
		前	70	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0
	08	後	103	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0	0
		前	57	0	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0
	09	後	105	0	0	0	105	1	0.3	0.003	105	0	0	0	105	0	0	0
		前	32	0	0	0	32	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	前	99	0	0	0	99	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			21	0	0	0	21	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	

調査時期			心枯病				ごま葉枯病				穂いもち							
年	月	期	調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		発病株率		発病株率	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	前後	117	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08	前後	70	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09	前後	103	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	前後	57	0	0	0	57	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	前後	105	0	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
	12	前後	-	-	-	-	32	0	0	0	32	12.5	100	3.6	20	0.7	-	-
	01	前後	-	-	-	-	99	0	0	0	99	17.2	14	0.8	1	0.04	-	-
	02	前後	-	-	-	-	21	0	0	0	21	19	4	0.4	1	0.1	-	-

調査時期			もみ枯病						ツマグロヨコバイ									
年	月	期	調 査	発 生	発病株率		発病株率		調 査	発 生	寄生株率		成虫		幼虫		合計	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	117	6.8	8	0.3	0.04	0.000	0.04	0.000	0.04	0.000
	07	前後	-	-	-	-	-	-	70	7.1	20	0.6	0.6	0.006	0.12	0.006	0.72	0.012
	08	前後	-	-	-	-	-	-	103	19.4	80	3.3	0.28	0.01	1.2	0.05	1.48	0.06
	09	前後	-	-	-	-	-	-	57	24.6	80	7.1	3	0.1	4	0.2	6	0.4
	10	前後	-	-	-	-	-	-	105	21	60	3.2	0.2	0.01	0.12	0.01	0.4	0.02
	11	前後	32	1	2	0.06	0.1	0.003	32	3.1	12	0.4	0.12	0.004	0.12	0.004	0.24	0.008
	12	前後	99	6.1	40	1.2	31	0.6	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	前後	21	4.7	1	0.05	0.1	0.004	21	4.7	4	0.2	0	0	0.04	0.002	0.04	0.002

調査時期			セジロウソバ									
年	月	期	調 査	発 生	寄生株率		成虫		幼虫		合計	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	前後	117	53	100	10.5	1.8	0.1	0.4	0.004	1.8	0.104
	08	前後	70	12.9	40	1.4	0.01	0.004	0.4	0.01	0.4	0.01
	09	前後	103	42.7	100	7.8	0.6	0.02	2.4	0.06	2.52	0.08
	10	前後	57	10.5	100	4	1	0.02	7	0.2	8	0.2
	11	前後	105	13.3	32	0.9	0.04	0.003	0.08	0.01	0.12	0.01
	12	前後	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	前後	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	前後	21	4.7	8	0.4	0.08	0.003	0	0	0.08	0.003

調査時期			トビロウソウ											
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生株率		成虫		幼虫		合計		短縮率	
					最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	前後	117	0.9	0.5	0.004	0.005	0.000	0	0	0.005	0.000	0	0
	08	前後	70	2.9	32	0.7	0	0	0.4	0.009	0.4	0.009	-	-
	09	前後	103	19.4	76	3.3	0.36	0.005	0.48	0.03	0.76	0.03	100	85
	10	前後	57	8.8	100	4.1	5	0.1	5	0.1	8	0.3	100	97.5
	11	前後	105	13.3	20	1.1	0.16	0.003	0.2	0.01	0.2	0.01	100	100
95	06	前後	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	07	前後	99	9.1	56	1.3	0.2	0.01	0.12	0.009	0.2	0.02	100	100
96	06	前後	21	23.8	88	6.3	0.08	0.004	1.6	0.1	1.6	0.1	100	100

調査時期			ヒメトビウンカ										コブノメイガ							
			調査 圃場数	発生 圃場率	寄生株率		成虫		幼虫		合計		調査 圃場数	発生 圃場率	被害葉 発生 圃場率	食害株率		10㎡当り成虫数		
最 高	平 均	最 高			平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高				平 均	最 高	平 均		
94	06	前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	07	後	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	
		前	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	42.9	32.9	84	27	8	10.2	
	08	後	103	7.8	1	0.06	0.04	0.002	0	0	0.04	0.002	103	75.7	32.2	90	15.4	150	8.3	
		前	57	1.8	4	0.07	0	0	0.04	0.00	0.04	0.001	57	33.3	31.2	100	29.5	13	1.3	
	後	105	4.8	4	0.2	0.04	0.002	0.04	0.001	0.08	0.002	105	69.5	34.3	100	28.1	150	16.7		
09	前	32	12.5	56	3.8	0.3	0.01	0.3	0.02	0.6	0.03	32	0	0	0	0	0	0		
	後	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0		
10	前	21	28.6	40	3.1	0.04	0.004	0.7	0.04	0.7	0.04	21	33.3	0	0	0	100	8.4		

調査時期			カメシ類				イネミズゾウムシ								イネゾウムシ							
年	月	期	調 査	発 生	20回振り成虫数		調 査	発 生	被害株 発 生 圃場率	食害株率		株当虫数		調 査	発 生	被害株 発 生 圃場率	食害株率		株当虫数			
			圃場数	圃場率	最 高	平 均				圃場数	圃場率	最 高	平 均				最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	07	前後	-	-	-	-	117	3.4	28.2	72	2.4	0.04	0.001	117	0	4.3	12	0.3	0	0		
		前後	-	-	-	-	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0		
	08	前後	103	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0		
		前後	57	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0		
	09	前後	105	14.3	3	0.2	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0		
95	06	前後	32	28.1	3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	07	前後	99	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
96	06	前後	21	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	07	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

調査時期			ニカメイガ				イネヨトウ				アワヨトウ				イネクロカメシ					
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生株率		調査 圃場数	発生 圃場率	食害株率	最高	平均	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生株率	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生株率		株当寄生虫数	
					最高	平均											最高	平均	最高	平均
94	06	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	前後	117	0	0	0	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	前後	70	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	前後	103	0	0	0	103	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	前後	57	0	0	0	57	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	前後	105	0	0	0	105	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
95	06	前後	32	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	前後	99	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
96	06	前後	21	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 麦類

平成6年産

大麦

調査時期			さび病類				うどんこ病				斑葉病				黒斑病			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	3	0	0	0	3	33.3	8	2.7	3	0	0	0	3	0	0	0
		5	35	0	0	0	35	37.1	1	0.3	35	11.4	0.3	0.01	35	0	0	0
		前後	9	22.2	1	0.1	9	55.5	78	12.3	9	0	0	0	9	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

調査時期			株腐病				赤かび病				黒穂病類			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
		5	35	0	0	0	35	37.1	1	0.2	35	0	0	0
		前後	9	0	0	0	9	88.9	18	2.8	9	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

調査時期			アブラムシ類				ハモグリバエ			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	株当虫数		調 査 圃場数	発 生 圃場率	被害率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	3	0	0	0	3	0	0	0
		5	35	0	0	0	35	0	0	0
		前後	9	0	0	0	9	11.1	2	0.2
			-	-	-	-	-	-	-	-

裸麦

調査時期			さび病類				うどんこ病				斑葉病				黒斑病			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	後	4	0	0	0	4	50	15	5	4	0	0	0	4	0	0	0
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

調査時期			株腐病				赤かび病				黒穂病類			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	発病茎率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	後	4	0	0	0	4	50	13	5.5	4	0	0	0
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

調査時期			アブラムシ類				ハモグリバエ			
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	株当虫数		調 査 圃場数	発 生 圃場率	被害率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	後	4	0	0	0	4	0	0	0
		5	-	-	-	-	-	-	-	-
		前後	-	-	-	-	-	-	-	-

小麦

調査時期			さび病類				うどんこ病				黒斑病			
年	月	期	調 査	発 生	発病率		調 査	発 生	発病率		調 査	発 生	発病率	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均
94	4	前	21	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0
		後	28	3.6	2	0.1	28	17.9	100	3.6	28	0	0	0
	5	前	17	41.2	100	13.5	17	35.3	52	4.1	17	0	0	0
		後	22	13.6	45	3.5	22	4.5	23	1	22	0	0	0

調査時期			株腐病				赤かび病				黒穂病類			
年	月	期	調 査	発 生	発病率		調 査	発 生	発病率		調 査	発 生	発病率	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均
94	4	前	21	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0
		後	28	0	0	0	28	3.6	0.002	0.0	28	0	0	0
	5	前	17	0	0	0	17	70.6	10	1.8	17	0	0	0
		後	22	0	0	0	22	31.8	11.4	1.1	22	4.5	1	0.05

調査時期			アブラムシ類				ハモグリバエ			
年	月	期	調 査	発 生	株当虫数		調 査	発 生	被害率	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均
94	4	前	21	19	0.2	0.02	21	4.8	0.002	0.0001
		後	28	28.6	1	0.1	28	0	0	0
	5	前	17	17.6	1	0.2	17	11.8	1	0.1
		後	22	0	0	0	22	9.1	8	0.5

(3) ジャガイモ

A 平成6年春作

調査時期			葉巻病				モザイク病				青枯病				疫病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最高	平均			最高	平均			最高	平均			最高	平均
94	4	前後	30	0	0	0	30	0	0	0	30	3	0.5	0.02	30	0	0	0
		41	0	0	0	0	41	0	0	0	41	2	0.2	0.01	41	10	59	1.8
		37	0	0	0	0	37	3	11	9.3	37	0	0	0	37	11	11	0.6
		32	9	17	0.9	0.9	32	6	13	0.4	32	6	1	0.05	32	22	86	3.2

調査時期			アブラムシ類						ニジュウヤホシテントウ						ジャガイモガ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	被害株率	
					最高	平均	最高	平均			最高	平均	最高	平均			最高	平均
94	4	前後	30	33	16	1.7	0.2	0.02	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0
		41	66	76	13.9	5.2	0.64	0.64	41	5	2	0.1	0.02	0.00	30	2	3	0.07
		37	89	100	37	70	9.25	9.25	37	5	6	0.2	0.06	0.00	37	8	36	1.5
		32	91	100	54	1200	143	143	32	6	4	0.1	0.04	0.00	32	0	0	0

調査時期			ヨトウムシ類							
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	被害株率		ハスモンヨトウ		その他	
					最高	平均	最高	平均	最高	平均
94	4	前後	31	3	0.1	0.00	0	0	0.00	0.00
		41	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	11	18	0.73	0	0	0	0.1	0.00
		32	6	2	0.08	0	0	0	0.02	0.00

B 平成6年秋作

調査時期			葉巻病				モザイク病				青枯病				疫病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最高	平均			最高	平均			最高	平均			最高	平均
94	9	後	27	0	0	0	27	0	0	0	27	4	1	0.04	27	0	0	0
		10	27	0	0	0	27	4	3	0.1	27	0	0	0	27	0	0	0
		32	0	0	0	0	32	0	0	0	32	3	0.2	0.01	32	0	0	0
		11	26	0	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0
		前後	28	7	20	0.8	28	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0

調査時期			アブラムシ類						ニジュウヤホシテントウ						ジャガイモガ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	被害株率	
					最高	平均	最高	平均			最高	平均	最高	平均			最高	平均
94	9	後	27	33	8	1.3	0.2	0.02	27	0	0	0	0	0	27	41	20	1.8
		10	48	20	33	10	0.46	0.46	27	0	0	0	0	0	27	52	32	5.0
		32	66	100	9	30	1.1	1.1	32	3	2	0.06	0.0	0.00	32	41	32	4.1
		11	26	96	100	44.9	300	28.8	26	0	0	0	0	0	26	46	16	3.2
		前後	28	89	100	66.6	1000	139.6	28	4	4	0.14	0.0	0.00	28	57	54	8.6

調査時期			ヨトウムシ類							
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	被害株率		ハスモンヨトウ		その他	
					最高	平均	最高	平均	最高	平均
94	9	後	27	44	84	4.0	0.4	0.02	0.64	0.03
		10	27	96	90	44.4	1	0.05	1.36	0.15
		32	81	80	23	0.02	0.00	0.00	0.6	0.03
		11	26	100	100	50.1	0	0	0.04	0.01
		前後	28	86	100	41.7	0.08	0.01	3	0.16

(5) サツマイモ

調査時期			ナカジロシタバ											
年	月	期	調 査	発 生	被害率		老齢虫数		中齢虫数		若齢虫数		合計虫数	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
94	7	後	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	後	8	33.3	15	3.1	0.01	0.001	0	0	0	0	0.01	0.001
	9	後	9	14.3	7	0.77	0.01	0.001	0	0	0	0	0.01	0.001

調査時期			ハスモンヨトウ											
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	被害率		老齢虫数		中齢虫数		若齢虫数		合計虫数	
					最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
14	7	後	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	後	8	62.5	20	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	後	9	42.8	10	1.6	0	0	0.1	0.01	0	0	0.1	0.01

調査時期			イモキバガ											
年	月	期	調 査	発 生	被害率		老齢虫数		中齢虫数		若齢虫数		合計虫数	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均	最 高	平 均
94	7	後	6	100	21	11.2	0	0	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.016
	8	後	8	100	40	21.5	0.01	0.001	0.04	0.01	0	0	0.05	0.01
	9	後	9	88.9	35	13.2	0	0	0.1	0.03	0	0	0.1	0.03

(6) 大豆

調査時期			べと病				葉焼病				ウイルス病				ハスモンヨトウ					
年	月	期	調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	発 生	発病株率		調 査	白変葉 発 生	寄生 株率		株当虫数	
			圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最 高	平 均	圃場数	圃場率	最高	平均	最高	平均
94	7	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	11	4	0.4	0.8	0.1
	8	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	17	1	0.2	0.01	0.01
	8	後	19	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	19	10.5	20	2.5	1.6	0.15
	9	前	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	85.7	12	5.7	2	0.39
	9	後	18	11.1	2	0.2	18	16.7	100	7.3	18	5.6	2	0.1	18	61.1	24	7.1	0.8	0.2
	10	前	10	0	0	0	10	20	20	2.8	10	0	0	0	10	40	20	5.0	2	0.25
		後	10	0	0	0	10	10	80	8	10	0	0	0	10	0	8	1.2	0.08	0.04

調査時期			ウワバ類						アブラムシ類				コガネムシ類				カメムシ類 (成幼虫)					
年	月	期	調 査 圃場数	発 生 圃場率	寄生株率		株当虫数		調 査 圃場数	発 生 圃場率	寄生株率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	寄生株率		調 査 圃場数	発 生 圃場率	寄生株率		株当虫数	
					最高	平均	最高	平均			最高	平均			最高	平均			最高	平均	最高	平均
94	7	後	9	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	11	28	3.1	0.3	0.03	
	8	前	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	17	2	0.3	0.02	0.03	
	8	後	19	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	19	23.6	24	3	0.72	0.1	
	9	前	7	14.3	4	0.6	0.04	0.00	7	0	0	0	7	0	0	0	7	71.4	20	5.7	0.2	0.06
	9	後	18	0	0	0	0	18	11.1	2	0.2	18	0	0	0	18	22.2	24	2.2	2	0.1	
	10	前	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	20	20	6.2	0.44	0.08	
		後	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	80	60	26	0.68	0.17	

大豆子実病害虫

調査時期		葉斑病	サヤタマバエ	カメムシ類
年	月	被害率	被害率	被害率
94	10 後	0.5	16.5	22.6

(6) みかん

調査時期			そうか病								かいよう病							
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	前後	48	2.1	1	0.03	-	-	-	-	48	0	0	0	-	-	-	-
	6	前後	48	6.1	30	0.6	-	-	-	-	47	0	0	0	-	-	-	-
	7	前後	48	20.8	64	2.6	48	4.2	20	0.5	48	4.2	1	0.02	48	0	0	0
	8	前後	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
	9	前後	48	10.4	20	0.6	48	8.3	12	0.7	48	10.4	0.3	0.08	45	0	0	0
	10	前後	21	0	0	0	21	4.8	2	0.1	21	19.0	6	0.7	21	0	0	0
	11	前後	38	0	0	0	41	0	0	0	44	20.5	4	0.3	44	4.5	4	0.1
	12	前後	21	0	0	0	21	9.5	4	0.4	21	28.6	10	0.9	21	0	0	0
	13	前後	29	6.9	4	0.2	48	4.2	2	0.05	48	22.9	4	0.3	48	2.1	2	0.04

調査時期			黒点病				灰色かび病				ミカンハダニ				アブラムシ類			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生新梢率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	48	22.9	58	2.9	-	-	-	-
	5	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	48	22.9	40	2.1	-	-	-	-
	6	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	49	28.6	18	1.3	-	-	-	-
	7	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	48	27.1	100	5.4	48	68.8	90	17.2
	8	前後	20	5.0	1	0.05	20	10.0	4	0.3	20	45.0	12	2.5	20	40.0	80	18.6
	9	前後	48	10.4	32	1.8	48	33.3	8	1.0	48	47.9	96	11.6	48	4.2	1	0.04
	10	前後	21	47.6	52	7.9	21	57.1	16	4.9	21	47.6	100	19.4	-	-	-	-
	11	前後	44	36.4	100	5.5	44	34.1	16	1.7	44	54.5	82	13.2	-	-	-	-
	12	前後	21	28.6	60	9.4	21	42.9	12	2.5	21	28.6	80	9.4	-	-	-	-
	13	前後	48	47.9	20	2.9	48	45.8	12	1.5	48	56.3	76	14.4	-	-	-	-
	14	前後	21	38.1	20	3.7	-	-	-	-	21	33.3	58	5.1	-	-	-	-
	15	前後	48	47.9	28	3.5	-	-	-	-	48	27.1	64	5.9	-	-	-	-

調査時期			チャノキイロアザミウマ								ヤノネカイガラムシ							
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	被害率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0	0	0	-	-	-	-
	7	前後	20	0	0	0	20	10.0	2	0.2	20	0	0	0	-	-	-	-
	8	前後	48	4.2	4	0.1	48	0	0	0	45	0	0	0	-	-	-	-
	9	前後	21	47.6	16	5.3	21	9.5	8	0.5	21	0	0	0	21	0	0	0
	10	前後	44	34.1	24	2.8	44	4.5	4	0.2	44	2.3	6	0.1	44	0	0	0
	11	前後	21	47.6	56	8.4	21	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0
	12	前後	48	62.5	28	4.5	42	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
	13	前後	21	85.7	60	17.7	21	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0

調査時期			マルカイガラムシ類				訪花性害虫			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生率		調査 圃場数	発生 圃場率	被害率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	前後	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	前後	-	-	-	-	20	5.0	1.0	0.05
	7	前後	21	0	0	0	21	0	0	0
	8	前後	44	0	0	0	44	2.3	1	0.02
	9	前後	21	4.8	4	0.2	21	4.8	4	0.2
	10	前後	48	0	0	0	48	0	0	0
	11	前後	21	0	0	0	-	-	-	-
	12	前後	48	4.2	6	0.2	-	-	-	-
	13	前後	22	4.5	4	0.2	-	-	-	-

(7) びわ

調査時期			がんしゅ病				灰斑病				褐斑病				アブラムシ類			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生枝葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	9	22.2	2	0.4	6	0	0	0	6	0	0	0	9	22.2	6	0.9
		後	10	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	10	22.2	10	1.2
	5	前後	6	16.7	10	1.7	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	9	22.2	6	0.9	9	0	0	0	9	0	0	0	9	22.2	4	0.7
	6	前後	6	16.7	2	0.3	6	50.0	6	2.3	6	33.3	4	1.0	6	0	0	0
		後	8	62.5	8	2.8	8	12.5	4	0.5	8	12.5	2	0.3	8	25.0	14	3.0
	7	前後	6	16.7	2	0.3	6	100	22	11.7	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	6	33.3	2	0.7	6	100	14	4.0	6	0	0	0	6	0	0	0
	8	前後																
		後																

調査時期			ナシマルカイガラムシ				ナシヒメシンクイ			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	寄生枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生枝葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	6	0	0	0	6	0	0	0
	5	前後	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	9	0	0	0	9	0	0	0
	6	前後	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	8	0	0	0	8	25.0	2	0.5
	7	前後	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	6	0	0	0	6	0	0	0
	8	前後	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	6	0	0	0	6	0	0	0

(8) なし

調査時期			黒星病				赤星病				うどんこ病			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	-	-	-	-	12	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	5	前後	14	28.6	4	0.6	11	27.2	5	0.7	14	28.6	22	3.1
		後	9	0	0	0	-	-	-	-	9	11.1	1	0.1
	6	前後	9	33.3	4	0.6	6	33.3	1	0.2	-	-	-	-
		後	12	58.3	8	1.8	6	33.3	4	0.8	-	-	-	-
	7	前後	9	33.3	4	0.5	9	33.3	4	0.7	-	-	-	-
		後	6	16.7	2	0.3	6	0	0	0	-	-	-	-
	8	前後	11	18.2	10	0.9	7	0	0	0	-	-	-	-
		後	12	8.3	4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	前後	10	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		後	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	前後	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		後	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		前後												
		後												

調査時期			黒斑病				ハダニ類				アブラムシ類			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生枝葉率		調査 圃場数	発生 圃場率	寄生新梢率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	-	-	-	-	12	16.7	6	0.6
		後	12	16.7	2	0.3	12	0	0	0	12	16.7	6	0.8
	5	前後	15	26.7	12	1.4	11	0	0	0	14	58.3	40	5.1
		後	9	55.6	8	2.4	-	-	-	-	9	0	0	0
	6	前後	9	22.2	6	0.7	-	-	-	-	9	11.1	1	0.1
		後	12	0	0	0	6	0	0	0	12	8.3	44	3.7
	7	前後	4	25.0	15	3.8	4	0	0	0	13	92.3	80	19.8
		後	6	33.3	12	2.0	6	0	0	0	12	100	100	48.2
	8	前後	11	0	0	0	7	0	0	0	11	90.9	52	19.9
		後	-	-	-	-	-	-	-	-	12	50.0	32	9.8
	9	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100	100	60.0
		後	-	-	-	-	-	-	-	-	6	100	50	17.7
	10	前後	-	-	-	-	-	-	-	-	6	100	78	31.1
		後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前後												
		後												

調査時期			カメムシ類			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	被害果率	
					最 高	平 均
94	5	前後	11	0	0	0
		後	9	0	0	0
	6	前後	-	-	-	-
		後	6	0	0	0
	7	前後	-	-	-	-
		後	6	0	0	0
8		前後	7	0	0	0
		後	3	0	0	0

(9) ふとう

調査時期			さび病				褐斑病				枝膨病				灰色かび病			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病新株率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率	
					最高	平均			最高	平均			最高	平均			最高	平均
94	4	後	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	-	-	-	-
	5	前	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	6	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	7	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	8	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	-	-	-	-
	9	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	-	-	-	-
	10	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	-	-	-	-
		前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	-	-	-	-
		後	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	-	-	-	-

調査時期			べと病								うどんこ病							
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率	
					最高	平均			最高	平均			最高	平均			最高	平均
94	4	後	6	0	0	0	-	-	-	-	9	0	0	0	-	-	-	-
	5	前	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	6	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	7	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	8	後	9	11.1	0.5	0.1	6	0	0	0	9	0	0	0	6	0	0	0
	9	前	6	0	0	0	-	-	-	-	6	0	0	0	-	-	-	-
	10	後	9	0	0	0	-	-	-	-	9	0	0	0	-	-	-	-
		前	6	0	0	0	-	-	-	-	6	0	0	0	-	-	-	-
		後	6	33.3	10	1.7	-	-	-	-	6	16.7	5	0.8	-	-	-	-

調査時期			黒とう病								晩腐病				チャノキイロアザミウマ			
年	月	期	調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	発病率		調査 圃場数	発生 圃場率	被害率	
					最高	平均			最高	平均			最高	平均			最高	平均
94	4	後	6	16.7	2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	前	9	33.3	10	2.7	9	0	0	0	-	-	-	-	9	11.1	2	0.2
	6	後	9	12.5	66.7	4.0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	11.1	1	0.1
	7	前	6	50.0	6	1.5	6	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	8	後	9	11.1	2	0.2	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	9	前	6	33.3	4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	後	9	22.2	4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前	6	50.0	2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		後	9	22.2	4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		後	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前	6	16.7	1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		後	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(10) 茶

調査時期			炭そ病				もち病				網もち病				チャノコカクモンハマキ			
年	月	期	調査 圃場数	発 生 圃場率	病葉数/1㎡		調査 圃場数	発 生 圃場率	病葉数/1㎡		調査 圃場数	発 生 圃場率	病葉数/1㎡		調査 圃場数	発 生 圃場率	病葉数/1㎡	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	5	前	6	0	0	0	6	16.7	8	1.3	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	9	0	0	0	9	11.1	1	0.1	9	0	0	0	9	0	0	0
	6	前	6	50.0	10	2.2	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	12	86.7	8	2.0	12	16.7	15	1.9	12	0	0	0	12	0	0	0
	7	前	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
		後	9	33.3	4	0.8	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	8	前	5	20.0	1	0.2	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
		後	9	33.3	10	2.8	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	9	前	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
		後	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	10	前	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
		後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0

調査時期			チャノホソガ				チャノヒメコイ				カンザワハダニ			
年	月	期	調査 圃場数	発 生 圃場率	巻葉数/1㎡		調査 圃場数	発 生 圃場率	虫数/4999797		調査 圃場数	発 生 圃場率	寄生葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前	12	0	0	0	12	0	0	0	12	50.0	14	3.9
		後	12	0	0	0	12	16.7	4	0.5	12	33.3	4	0.8
	5	前	6	16.7	2	0.3	6	0	0	0	6	66.7	6	1.5
		後	9	0	0	0	9	44.4	2	0.6	16	68.8	22	5.1
	6	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	50.0	39	7.8
		後	12	8.3	1	0.1	12	25.0	3	0.7	12	50.0	40	9.9
	7	前	5	0	0	0	5	40.0	2	0.8	5	0	0	0
		後	9	0	0	0	9	33.3	5	1.0	9	33.3	5	1.1
	8	前	5	0	0	0	5	20.0	1	0.2	5	60.0	2	1.0
		後	9	0	0	0	9	33.3	4	0.9	9	55.6	62	12.2
	9	前	5	0	0	0	5	80.0	3	1.4	5	0	0	0
		後	6	0	0	0	6	16.7	1	0.2	6	0	0	0
	10	前	5	0	0	0	5	80.0	41	14.2	5	40.0	6	1.6
		後	9	0	0	0	9	44.4	27	4.6	9	33.3	7	1.1

(11) トマト

平成5年秋定植

調査時期			モザイク病				青枯・萎凋症				疫 病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	12	8	3	0.25	12	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	8	0.3	0.03	12	0	0	0
	5	前後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
		後	11	0	0	0	11	9	0.5	0.05	11	0	0	0

調査時期			葉かび病				灰色かび病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	25	96	12.3	12	42	3	0.38
		後	12	50	100	30.2	12	33	4	0.44
	5	前後	12	58	100	26.8	12	8	1	0.08
		後	11	45	100	35.27	11	0	0	0

調査時期			アブラムシ類				コナジラミ類			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	12	25	60	5.8
		後	12	8	4	0.33	12	17	40	5.8
	5	前後	12	25	16	2.3	12	58	24	7.7
		後	11	18	12	2	11	55	100	24.36

平成6年秋定植

調査時期			モザイク病				青枯・萎凋症				疫 病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前後	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
		後	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0

調査時期			葉かび病				灰色かび病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前後	8	0	0	0	8	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	0	0	0
		後	15	0	0	0	15	0	0	0

調査時期			アブラムシ類				コナジラミ類			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前後	8	0	0	0	8	63	52	9.5
		後	12	0	0	0	12	67	52	10.8
		後	15	0	0	0	15	20	4	0.7

(12) きゅうり

平成5年秋定植

調査時期			モザイク病				斑点細菌病				べと病				褐斑病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病葉率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	83	53	13.8	12	0	0	0
		13	0	0	0	0	13	0	0	0	13	62	80	17.6	13	0	0	0
		5	12	0	0	0	12	0	0	0	12	83	52	16.9	12	0	0	0
		前後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	75	52	15.83	12	8	3	0.25

調査時期			炭そ病				うどんこ病				灰色かび病				菌核病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病葉率		調査圃場数	発生圃場率	発病葉率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	17	5	0.63	12	8	0.2	0.02
		13	0	0	0	0	13	15	40	3.1	13	46	12	1.9	13	0	0	0
		5	12	0	0	0	12	50	53	9.8	12	17	1	0.17	12	0	0	0
		前後	12	0	0	0	12	42	100	12.92	12	25	1	0.2	12	0	0	0

調査時期			アブラムシ類				スリップス類				コナジラミ類				ウリハムシ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率		調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率		調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率		調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	8	3	0.25	12	0	0	0
		13	8	31	2.4		13	31	78	9.1	13	8	2.5	0.19	13	0	0	0
		5	12	0	0	0	12	17	11	1	12	33	100	12.7	12	0	0	0
		前後	12	0	0	0	12	17	21	2.17	12	33	16	2.17	12	0	0	0

平成6年秋定植

調査時期			モザイク病				斑点細菌病				べと病				褐斑病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病葉率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前後	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
		14	0	0	0	0	14	0	0	0	14	14	10	0.8	14	21	20	1.6
		12	16	0	0	0	16	0	0	0	16	25	50	5.8	16	13	15	0.97

調査時期			炭そ病				うどんこ病				灰色かび病				菌核病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病葉率		調査圃場数	発生圃場率	発病葉率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前後	5	0	0	0	5	60	40	8.7	4	0	0	0	4	0	0	0
		14	0	0	0	0	14	29	12	1.9	10	0	0	0	10	0	0	0
		12	16	0	0	0	16	19	12	1.9	13	15	3	0.3	13	30	7	0.8

調査時期			アブラムシ類				スリップス類				コナジラミ類				ウリハムシ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率		調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率		調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率		調査圃場数	発生圃場率	寄生葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前後	5	0	0	0	5	80	6.5	2.2	5	100	54	28.2	5	0	0	0
		14	0	0	0	0	14	0	0	0	14	21	10	0.9	14	0	0	0
		12	16	0	0	0	16	19	90	6.3	16	38	70	5.8	16	0	0	0

(13) スイカ

調査時期			モザイク病				疫 病				炭そ病 (葉)			
年	月	期	調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病株率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病株率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
		後前	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	5	前後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
		後後	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
	6	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0

調査時期			炭そ病 (果実)				つる枯病			
年	月	期	調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病果率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病徒率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	-	-	-	-	9	0	0	0
		後前	-	-	-	-	9	0	0	0
	5	前後	3	0	0	0	9	0	0	0
		後後	8	0	0	0	8	0	0	0
	6	後	9	0	0	0	9	11	1	0.11

調査時期			アブラムシ類						ハダニ類				スリップス類				ウリハムシ			
年	月	期	調査 圃場 数	発生 圃場 率	寄生葉率		株当たり虫数		調査 圃場 数	発生 圃場 率	寄生葉率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	寄生葉率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	葉当たり虫数	
					最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	9	11	3	0.33	0.3	0.03	9	22	15	1.9	9	0	0	0	9	0	0	0
		後前	9	11	0.5	0.06	0.1	0.01	9	11	0.5	0.06	9	0	0	0	9	0	0	0
	5	前後	9	11	1	0.11	0.1	0.01	9	11	31	3.4	9	0	0	0	9	11	1	0.11
		後後	8	88	12	4.4	0.2	0.09	8	75	41	17.3	8	50	10	2.5	8	38	1	0.38
	6	後	9	89	78	21	10	4.78	9	33	46	6.44	9	0	0	0	9	0	0	0

(14) メロン

平成6年春定植

調査時期			モザイク病				えそ斑点病				つる枯病			
年	月	期	調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病株率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病株率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
		後前	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0
	5	前	15	0	0	0	15	0	0	0	15	13	4	0.4

調査時期			斑点細菌病				べ と 病				うどんこ病			
年	月	期	調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病葉率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病徒率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	発病葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
		後前	16	0	0	0	16	6	16	1	16	13	2	0.19
	5	前	15	0	0	0	15	7	12	0.8	15	47	16	3

調査時期			アブラムシ類				ハダニ類				スリップス類			
年	月	期	調査 圃場 数	発生 圃場 率	寄生葉率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	寄生葉率		調査 圃場 数	発生 圃場 率	寄生葉率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前後	15	7	4	0.27	15	20	20	2.9	15	0	0	0
		後前	16	13	4	0.28	16	6	10	0.6	16	13	4	0.38
	5	前	15	20	40	4.4	15	20	50	4.27	15	7	10	0.67

(15) はくさい

調査時期			モザイク病				軟腐病				菌核病				べと病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	9	後	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	10	後	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
	11	後	9	11	0.2	0.02	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	12	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	11	20	2.2

調査時期			白斑病				黒斑病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	9	後	6	0	0	0	6	0	0	0
	10	後	11	0	0	0	11	0	0	0
	11	後	9	0	0	0	9	0	0	0
	12	後	9	33	4	1.1	9	0	0	0

調査時期			モンシロチョウ						アブラムシ類						コナガ					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数	
					最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	9	後	6	0	0	0	0	0	6	50	8	3.3	0.32	0.09	6	67	48	12.7	3	0.57
	10	後	11	9	4	0.36	0.04	0.00	11	18	8	1.1	0.08	0.01	11	64	100	21.5	10	1.7
	11	後	9	0	0	0	0	0	9	33	12	2.2	0.12	0.02	9	44	48	13.3	1.2	0.22
	12	後	9	0	0	0	0	0	9	22	8	1.3	0.04	0.02	9	33	100	15.1	8.2	0.97

調査時期			ハスモンヨトウ						ヨトウガ						ハイマダラノメイガ					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数	
					最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	9	後	6	17	4	0.57	0.04	0.01	6	17	4	0.57	0.04	0.01	6	0	0	0	0	0
	10	後	11	0	0	0	0	0	11	27	8	1.5	0.08	0.01	11	0	0	0	0	0
	11	後	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	12	後	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0

(16) キャベツ

調査時期			黒腐病				黒斑病				べと病				菌核病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	9	後	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0
	10	後	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0
	11	後	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0
	12	後	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0

調査時期			アブラムシ類						コナガ						モンシロチョウ					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数	
					最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	9	後	14	43	8	2.3	0.16	0.03	14	50	100	18.8	10	1.04	14	14	12	1.1	0.12	0.01
	10	後	17	19	8	0.9	0.1	0.01	17	88	100	38.3	6.4	1.01	17	6	4	0.2	0.04	0.00
	11	後	14	15	8	1.2	10	0.78	14	86	100	28.7	4	0.66	14	0	0	0	0	0
	12	後	13	23	48	6.2	2.44	0.29	13	77	76	25.2	1.2	0.4	13	0	0	0	0	0

調査時期			ハスモンヨトウ						ヨトウガ						ウワバエ類					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数	
					最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	9	後	14	36	8	1.7	1.2	0	14	43	32	4.9	8	0.61	13	0	0	0	0	0
	10	後	17	29	80	11.5	5	0	17	29	100	13.8	5	0.78	17	24	28	2.6	0.5	0.05
	11	後	14	0	0	0	0	0	14	7	4	0.3	0.04	0.00	14	7	4	0.3	0.04	0.00
	12	後	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0

(17) タマネギ

平成5年秋定植

調査時期			萎黄病				白色疫病				べと病				ボトリチスによる葉枯症			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前	18	0	0	0	18	28	10	1.1	18	0	0	0	18	28	100	13.9
		後	16	0	0	0	16	25	2	0.3	16	0	0	0	16	50	100	22.6
		5 前	10	0	0	0	10	40	12	2.5	10	10	8	0.8	10	50	25	7.1

調査時期			黒斑病				ネギザミウム				アブラムシ類			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	4	前	18	6	0.5	0.03	18	67	68	16.2	18	6	4	0.2
		後	15	0	0	0	16	88	100	63	16	0	0	0
		5 前	4	0	0	0	10	100	100	92	10	0	0	0

平成6年秋定植

調査時期			萎黄病				白色疫病				べと病				ボトリチスによる葉枯症			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
		12 後	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0

調査時期			黒斑病				ネギザミウム				アブラムシ類			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	11	前	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
		後	12	0	0	0	12	17	40	4	12	0	0	0
		12 後	20	0	0	0	20	35	100	13.4	20	0	0	0

(18) ニンジン

調査時期			黒葉枯病				黒斑病				うどんこ病				ネキリムシ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	8	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	9	前	11	36	20	4.7	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
		後	15	13	4	0.4	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
	10	前	9	22	10	1.1	9	0	0	0	9	56	40	15.1	9	0	0	0
		後	15	0	0	0	15	0	0	0	15	27	62	7.7	15	0	0	0
	11	前	6	17	2	0.3	6	0	0	0	6	100	100	73.3	6	0	0	0
12	後	後	12	50	16	5.2	12	0	0	0	12	92	100	53	12	0	0	0
			15	20	14	1.5	15	0	0	0	15	100	100	49.7	15	0	0	0

調査時期			アブラムシ類				ヨトウガ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	8	後	9	0	0	0	9	0	0	0
	9	前	11	0	0	0	11	0	0	0
		後	15	0	0	0	15	40	4	0.9
	10	前	9	0	0	0	9	33	2	0.9
		後	15	7	4	0.3	15	13	4	0.3
	11	前	6	0	0	0	6	17	1	0.2
12	後	後	12	0	0	0	12	0	0	0
			15	0	0	0	15	7	2	0.1

(19) レタス

調査時期			萎黄病				斑点細菌病				腐敗病				灰色かび病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	10	前	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
		後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
	11	前	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
		後	13	0	0	0	13	0	0	0	13	8	1	0.08	13	0	0	0
12	後	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	11	0.1	0.01	9	11	0.2	0.02

調査時期			菌核病				すす枯病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	10	前	11	0	0	0	11	0	0	0
		後	9	0	0	0	9	0	0	0
	11	前	9	0	0	0	9	0	0	0
		後	13	8	1	0.08	13	0	0	0
12	後	後	9	33	1	0.2	9	0	0	0

調査時期			ネキリムシ				アブラムシ類				ハスモンヨトウ					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		株当虫数	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	10	前	11	0	0	0	11	9	2	0.18	11	9	0.5	0.05	0.01	0.00
		後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	11	4	0.44	0.08	0.01
	11	前	9	0	0	0	9	22	14	2.6	9	33	4	0.67	0.04	0.01
		後	13	0	0	0	13	15	4	0.46	13	31	4	0.7	0.08	0.01
12	後	後	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0

(20) いちご

育苗床

調査時期			うどんこ病				炭 そ 病				萎 黄 病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	5	前後	21	57	94	20.3	21	0	0	0	21	0	0	0
		後	25	88	100	49.2	25	0	0	0	25	0	0	0
	6	前後	21	100	92	44.6	21	5	0.3	0.01	21	0	0	0
		後	29	93	100	41.9	29	0	0	0	29	0	0	0
	7	前後	28	100	70	29.1	28	4	1	0.04	28	0	0	0
		後	24	25	6	0.9	24	4	0.2	0.01	24	0	0	0
	8	前後	31	3	2	0.1	31	10	4	0.15	31	0	0	0
		後	30	0	0	0	30	7	12	0.14	30	0	0	0
	9	前後	23	0	0	0	23	22	4	0.4	23	4	1	0.04
		後												

調査時期			輪 斑 病				ジャのめ病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	5	前後	21	0	0	0	21	0	0	0
		後	25	0	0	0	25	0	0	0
	6	前後	21	0	0	0	21	0	0	0
		後	29	0	0	0	29	0	0	0
	7	前後	28	4	2	0.07	28	0	0	0
		後	24	0	0	0	24	0	0	0
	8	前後	31	23	46	2.85	31	0	0	0
		後	30	7	2	0.13	30	0	0	0
	9	前後	23	9	12	0.7	23	0	0	0
		後								

調査時期			ハダニ類				アブラムシ類				ハスモンヨトウ					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		株当幼虫数	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	5	前後	21	38	74	10.2	21	24	16	1.5	21	0	0	0	0	0
		後	25	40	82	9	25	20	18	1.4	25	0	0	0	0	0
	6	前後	21	62	66	22.1	21	67	48	13.1	21	0	0	0	0	0
		後	29	28	42	3.7	29	24	18	1.9	29	3	4	0.14	0	0
	7	前後	28	25	100	6.4	28	21	28	4.6	28	11	4	0.4	0.02	0.00
		後	24	63	78	12	24	46	78	9.2	24	33	8	1.3	0.04	0.00
	8	前後	31	48	94	12.2	31	42	22	4.1	31	71	36	7.2	24	4.3
		後	30	20	100	5.2	30	33	18	2.7	30	70	40	6.4	0.2	0.04
	9	前後	23	9	10	0.6	23	22	20	1.7	23	83	44	11.3	0.22	0.01
		後														

調査時期			コガネムシ類						スリップス類						メセンチュウ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	被害株率		株当成虫数		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		株当虫数		調査圃場数	発生圃場率	被害株率	
					最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均			最 高	平 均
94	5	前後	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0
		後	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0
	6	前後	21	0	0	0	0	0	21	33	20	2.9	8	0.86	21	0	0	0
		後	29	17	8	0.8	0.06	0.00	29	3	2	0.07	2	0.07	29	0	0	0
	7	前後	28	29	14	1.5	4	0.1	28	7	4	0.2	0	0	28	0	0	0
		後	24	13	14	0.92	0	0	24	13	4	0.33	0.08	0.01	24	0	0	0
	8	前後	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0
		後	30	10	4	0.33	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0
	9	前後	23	4	2	0.09	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0
		後																

本園

調査時期			炭 そ 病				萎 黄 病				うどんこ病 (葉)				うどんこ病 (果実)			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	9	後	26	0	0	0	26	4	1	0.04	26	0	0	0	-	-	-	-
	10	前	21	5	1	0.05	21	0	0	0	21	0	0	0	-	-	-	-
	11	前	33	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	-	-	-	-
	11	後	25	4	0.5	0.02	25	4	0.2	0.01	25	0	0	0	19	0	0	0
	12	後	27	11	7	0.3	27	0	0	0	27	15	14	1.1	25	16	2	0.2
	12	後	25	4	0.5	0.02	25	0	0	0	25	12	8	0.6	25	8	0.5	0.03

調査時期			灰色かび病				菌 核 病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病果率		調査圃場数	発生圃場率	発病果率	
					最 高	平 均			最 高	平 均
94	9	後	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	前	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	前	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	後	25	4	0.0	0.00	25	0	0	0
	12	後	25	8	0.2	0.02	25	0	0	0

調査時期			アブラムシ類				ハダニ類				ハスモンヨトウ					
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		株当虫数	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均	最 高	平 均
94	9	後	26	31	52	5.6	26	0	0	0	26	81	84	2.38	0.06	0.01
	10	前	21	43	12	2	21	0	0	0	21	90	64	18.9	0.04	0.01
	11	前	33	39	60	4.5	33	3	8	0.24	33	82	80	21.9	0.16	0.01
	11	後	25	56	80	12	25	16	80	3.6	25	80	54	12.	0.06	0.01
	12	後	27	48	54	5.3	27	11	4	0.3	27	74	34	7.6	0.04	0.00
	12	後	25	40	56	6.5	25	16	26	1.7	25	64	78	10.6	6	0.01

(21) しょうが

調査時期			モザイク病				根茎腐敗病				白 星 病				紋 枯 病			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率		調査圃場数	発生圃場率	発病株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	6	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	7	後	12	0	0	0	12	8	3	0.25	12	0	0	0	12	0	0	0
	8	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	9	後	6	17	0.3	0.05	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	10	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0

調査時期			アブラムシ類				イネヨトウ				アワノメイガ				ハスモンヨトウ			
年	月	期	調査圃場数	発生圃場率	寄生株率		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		調査圃場数	発生圃場率	被害株率		調査圃場数	発生圃場率	被害株率	
					最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均			最 高	平 均
94	6	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	7	後	12	0	0	0	12	0	0	0	12	8	2	0.16	12	0	0	0
	8	後	12	0	0	0	12	8	1	0.08	12	50	10	1.8	12	25	15	1.8
	9	後	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
	10	後	12	0	0	0	12	17	6	0.8	12	50	22	6.2	12	17	6	0.6