

(2) 県予察圃場調査成績

作物：早期水稻	品種：コシヒカリ
---------	----------

調査時期			葉いもち		紋枯病		ばか苗病		萎縮病		縞葉枯病		ごま葉枯病		穂いもち			籾枯細菌病		
			発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	病穂率	発病度	発病株率	発病穂率	発病度
2013	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		28	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	7	5	0	0	5	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		12	0	0	10	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	0	0	44	18.5	0	0	0	0	0	0	3	1.5	0	0	0	0	0	0
	8	6	0	0	61	27.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			ヒメビウカ				センダングサ				トビイロカ				ツマグロヨコバイ				カメムシ数 / 20回振		
			寄生 株率	株当虫数			寄生 株率	株当虫数			寄生 株率	株当虫数			寄生 株率	株当虫数			ホバカ メムシ	シホカ メムシ	他のカ メムシ
				成虫	幼虫	合計		成虫	幼虫	合計		成虫	幼虫	合計		成虫	幼虫	合計			
2013	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0	0.02	-	-	-	
		6	3	2	0.02	0	0.02	14	0.16	0	0.16	0	0	0	92	0.32	2.88	3.22	-	-	-
	7	14	16	0.06	0.14	0.20	58	0.02	1.44	1.46	0	0	0	96	0.12	4.08	4.20	-	-	-	
		28	16	0.12	0.04	0.16	30	0.06	0.32	0.38	8	0.06	0.08	0.14	88	0.12	2.84	2.96	-	-	-
		5	18	0.10	0.08	0.18	16	0.02	0.14	0.16	0	0	0.02	0.02	72	0.22	1.20	1.42	-	-	-
		12	4	0	0.04	0.04	0	0	0.00	0	2	0	0.02	0.02	20	0	0.30	0.30	0	0	4.6
	8	31	8	0.02	0.10	0.12	10	0.04	0.06	0.10	48	0.36	0.42	0.78	28	0.04	0.30	0.34	0	0	1
		6	20	0.02	0.20	0.22	30	0.16	0.28	0.44	52	0.46	0.66	1.12	76	0.02	2.02	2.04	-	-	-

調査時期			イヌシラギ			コナメノミ		
			食害株率	被害度	成虫数/株	食害株率	食害葉数/株	幼虫寄生株率
2013	5	14	6	11	0.06	0	0	0
	6	3	6	5.5	0.22	0	0	0
		14	0	0	0	0	0	0
		28	-	-	-	4	0.06	0
	7	5	-	-	-	4	0.04	0
		12	-	-	-	2	0.02	0
		31	-	-	-	34	0.8	0
	8	6	-	-	-	60	1.72	0

作物：普通期水稻	品種：ヒノヒカリ
----------	----------

調査時期			葉いもち		紋枯病		ばか苗病		萎縮病		縞葉枯病		こま葉枯病		穂いもち			初枯細菌病		
			発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	病穂率	発病度	発病株率	発病穂率	発病度
13	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	8	31	0.1	0.03	4	1.0	0	0	0	0	0.3	0.08	0	0	-	-	-	-	-	-
		6	0	0	22	5.5	0	0	0	0	0.3	0.08	0	0	-	-	-	-	-	-
		13	0	0	67	17.3	0	0	0	0	0.3	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	26	0	0	74	30.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	0	0	85	34.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	100	60.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.03	0.03	0	0	0
	24	24	0	0	100	71.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			ヒメビウカ				セウロウカ				ヒイロウカ				ツマグロヨコバイ				カメシ数 / 20回振			
			寄生株率	株当虫数			寄生株率	株当虫数			寄生株率	株当虫数			寄生株率	株当虫数			お川カメシ	汚糸カメシ	他のカメシ	
				成虫	幼虫	合計		成虫	幼虫	合計		成虫	幼虫	合計		成虫	幼虫	合計				
13	6	28	0	0	0	0	8	0.08	0.00	0.08	0	0	0	0	2	0	0.02	0.02	-	-	-	
		7	5	6	0.06	0	0.06	14	0.18	0.04	0.22	0	0	0	0	8	0	0.10	0.10	-	-	-
		12	26	0.06	0.26	0.32	48	0.06	0.60	0.66	22	0.04	0.26	0.30	34	0.02	0.80	0.82	-	-	-	
	8	31	34	0.06	0.40	0.46	42	0.30	0.32	0.62	52	0.32	0.44	0.76	50	0.04	0.88	0.92	-	-	-	
		6	20	0.02	0.20	0.22	30	0.16	0.28	0.44	52	0.46	0.66	1.12	76	0.02	2.02	2.04	-	-	-	
		13	56	0.06	1.22	1.28	66	0.02	2.36	2.38	88	0.24	2.82	3.06	60	0.10	1.24	1.34	-	-	-	
	9	26	26	0.20	0.10	0.30	20	0.18	0.08	0.26	78	1.78	0.86	2.64	0	0	0	0	0.6	0.2	1.0	
		4	36	0.48	0.02	0.50	6	0.06	0.00	0.06	98	5.40	3.16	8.56	10	0.06	0.08	0.14	1	0	1.2	
		13	32	0.04	1.00	1.04	6	0.00	0.06	0.06	100	0.58	26.70	27.26	26	0	0.60	0.60	0	0	1.2	
	24	16	0.10	0.12	0.22	30	0.12	0.70	0.82	92	1.66	16.40	18.06	38	0.02	1.30	1.32	0	0	2.0		

調査時期			イネミズゾウムシ			コナメイト			ニガハフ			イモシツゼリ			ワケナガ	
			食害株率	被害度	成虫数/株	食害株率	食害葉数/株	幼虫寄生株率	食害株率	幼虫寄生株率	幼虫数/株	食害株率	幼虫寄生株率	幼虫数/株	食害株率	幼虫数/株
13	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	0	0	0	2	0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	0	0	0	12	0.3	0	0	0	0	2	2	0.02	0	0
	8	31	-	-	-	50	1.4	0	0	0	0	2	0.02	0	0	0
		6	-	-	-	60	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	-	-	-	76	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	26	-	-	-	96	8.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	-	-	-	100	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	24	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			イネゾク			アサゾク		
			食害株率	幼虫寄生株率	幼虫数/株	食害株率	幼虫寄生株率	幼虫数/株
13	6	28	0	0	0	0	0	0
		7	0	0	0	0	0	0
		12	0	0	0	0	0	0
	8	31	0	0	0	0	0	0
		6	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0
	9	26	0	0	0	0	0	0
		4	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0
	24	24	0	0	0	0	0	0

作物：小麦	品種：シロガネコムギ
-------	------------

調査時期			さび病類		うどんこ病		萎縮病類		黒節病		赤かび病		黒穂病	
			発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 穂率	発病度	発病 穂率	発病度
13	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			アブラムシ類		ハゲリハエ類	
			発病 茎率	虫数 /1茎	発病 茎率	虫数 /1茎
13	3	7	1	0.01	0	0
		13	0	0	0	0
		26	1	0.01	0	0
	4	3	2	0.07	0	0
		15	11	0.17	0	0
		22	2	0.07	0	0
	5	1	3	0.14	0	0
		14	29	1.09	0	0

作物：小麦	品種：チクゴイズミ
-------	-----------

調査時期			さび病類		うどんこ病		萎縮病類		黒節病		赤かび病		黒穂病	
			発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 穂率	発病度	発病 穂率	発病度
13	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			アブラムシ類		ハゲリハエ類	
			発病 茎率	虫数 /1茎	発病 茎率	虫数 /1茎
13	3	7	0	0	0	0
		13	0	0	0	0
		26	5	0.07	0	0
	4	3	14	0.39	0	0
		15	10	0.15	0	0
		22	3	0.16	0	0
	5	1	14	0.31	0	0
		14	26	1.15	0	0

作物：大麦	品種：ニシノホシ
-------	----------

調査時期			さび病類		うどんこ病		斑葉病		萎縮病類		黒節病	
			発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度
13	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			赤かび病		黒穂病		アブラムシ類		ハゲリハエ類	
			発病 穂率	発病度	発病 穂率	発病度	発病 茎率	虫数 /1茎	発病 茎率	虫数 /1茎
13	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	5	0.13	0	0
	4	3	0	0	0	0	6	0.14	0	0
		15	0	0	0	0	6	0.13	0	0
		22	0	0	0	0	1	0.01	0	0
	5	1	0	0	0	0	3	0.07	0	0

作物：裸麦	品種：御島稈
-------	--------

調査時期			さび病類		うどんこ病		萎縮病類		黒節病		赤かび病		黒穂病	
			発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 茎率	発病度	発病 穂率	発病度	発病 穂率	発病度
13	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査時期			アブラムシ類		ハダニ類	
			発病 茎率	虫数 /1茎	発病 茎率	虫数 /1茎
13	3	7	0	0	0	0
		13	2	0.02	0	0
		26	8	0.18	0	0
	4	3	21	0.3	0	0
		15	8	0.14	0	0
		22	16	0.4	0	0
	5	1	16	0.62	0	0
		14	17	0.36	0	0

作物：大豆	品種：フクユタカ
-------	----------

調査時期			べと病		葉焼病		ウイルス病		ハスモンヨトウ			ウワバ類	
			発病株率	発病度	発病株率	発病度	発病株率	発病度	白変葉数/a	寄生株率	寄生虫数/株	寄生株率	寄生虫数/株
13	7	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00	0	0
		26	2	0.5	0	0.0	0	0	5	18	0.22	0	0
	9	4	0	0	2	0.5	0	0	3	38	0.04	0	0
		13	4	1.0	38	9.5	0	0	2	34	0.08	2	0.02
		24	6	1.5	42	10.5	0	0	5	34	1.06	2	0.02
	10	4	20	5.0	30	7.5	0	0	10	56	1.30	0	0
		15	10	2.5	82	21.5	0	0	0	4	0.04	2	0.02
		31	8	2.0	96	24.0	0	0	0	0	0	2	0.02

調査時期			吸実性カメムシ類		アブラムシ類		コガネムシ類	
			寄生株率	寄生虫数/株	寄生株率	寄生虫数/株	寄生株率	寄生虫数/株
13	7	31	0	0	2	0.02	0	0
	8	6	4	0.06	0	0	0	0
		13	4	0.06	0	0	0	0
		26	6	0.06	0	0	0	0
	9	4	8	0.08	0	0	0	0
		13	6	0.10	0	0	0	0
		24	10	0.36	6	0.2	0	0
	10	4	48	0.56	16	1.5	0	0
		15	52	0.64	14	0.6	0	0
		31	10	0.10	2	0.1	0	0

（子実調査）

調査時期			紫斑病	ダ'イ'サマ'ル' I	カメムシ類
年	月	期	被害粒率	被害莢率	被害粒率
13	11	前	0	0.45	62.6

作物:温州みかん	品種:宮川早生、青島温州	樹齡:28年生
----------	--------------	---------

散布時期				薬剤名	倍数
13	5.7			デランフロアブル	1000倍
	5.29			デランフロアブル	1000倍
	6.21			スブラサイド乳剤	1500倍

散布時期				薬剤名	倍数
10.10				ジマンダイセン水和剤	600倍
11.15				ジマンダイセン水和剤	600倍
12.9				ペフラン液剤25	2000倍

調査時期			そうか病				かいよう病			
			無防除区		防除区		無防除区		防除区	
			葉	果実	葉	果実	葉	果実	葉	果実
			発病葉率	発病果率	発病葉率	発病果率	発病葉率	発病果率	発病葉率	発病果率
13	4	8	8	-	4	-	0	-	0	-
	4	23	3	-	14	-	0	-	10	-
	5	7	0	-	6	-	0	-	0	-
	5	23	3	0	8	0	0	0	0	0
	6	5	1	0	4	0	0	0	1	0
	6	28	0	27	6	70	0	0	0	0
	10	1	0	9	0	44	0	0	0	0

調査時期			黒点病		ミカンハダニ		ミカンサビダニ		アブラムシ類	
			無防除区	防除区	無防除区	防除区	無防除区	防除区	無防除区	防除区
			発病果率	発病果率	寄生葉率	寄生葉率	被害果率	被害果率	寄生新梢率	寄生新梢率
13	4	8	-	-	1	0	-	-	-	-
	4	23	-	-	0	0	-	-	0	1
	5	7	-	-	0	0	-	-	4	13
	5	23	-	-	0	0	-	-	28	15
	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	28	0	2	2	2	0	0	0	0
	10	1	0	53	0	0	14	39	0	0

調査時期			チャノキイロアザミウマ				ヤノネカイガラムシ		マルカイガラムシ類	
			無防除区		防除区		無防除区	防除区	無防除区	防除区
			果梗部	果頂部	果梗部	果頂部				
			被害果率	被害果率	被害果率	被害果率	寄生果率	寄生果率	寄生果率	寄生果率
13	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	1	5	0	0	0	0	0	6	12

作物: びわ	品種: 長崎早生(無防除)	樹齢: 24年生
--------	---------------	----------

調査時期			がんしゅ病		灰斑病		褐斑病		ナシヒメシクイ		ハマキムシ類		ナシマルカイガラムシ		アブラムシ類	
			発生 葉率	発生 枝葉率	発生 葉率	発生 枝葉率	発生 葉率	発生 枝葉率	発生 葉率	発生 枝葉率	発生 葉率	発生 枝葉率	発生 葉率	発生 枝葉率	発生 葉率	発生 枝葉率
13	4	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	5	7	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0
		23	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	6	5	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		28	0.2	1.0	5.8	16.0	0.0	0.0	0.2	1.0	9.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	1	0.2	2.0	3.8	28.0	0.0	0.0	0.1	1.0	5.7	28.0	0.0	0.0	0.0	2.0

作物：ジャガイモ（春作マルチ）	品種：ニシユタカ	植付：2013年2月25日
-----------------	----------	---------------

調査時期			葉巻病	サトウ病	青枯病	疫病	アブラムシ類		ジャガイモ
年	月	日	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	株当虫数	被害株率
13	4	5	0	0	0	0	0	0	0
		18	0	0	0	0	2.0	0.02	0
		5 10	0	0	0	0	14.0	0.3	0

調査時期			ヨトウムシ類	ハスモンヨトウ		シロイロシヨトウ		ニジュウヤホシテントウ	
年	月	日	被害株率	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	4	5	0	0	0	0	0	0	0
		18	0	0	0	0	0	0	0
		5 10	0	0	0	0	0	0	0

作物：ジャガイモ（秋作）	品種：ニシユタカ	植付：2013年9月21日
--------------	----------	---------------

調査時期			葉巻病	サトウ病	青枯病	疫病	アブラムシ類		ジャガイモ
年	月	日	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	株当虫数	被害株率
13	10	15	0	0	0	0	0	0	0
		11 1	0	0	0	0	2.0	0.02	0
		21	0	0	0	0	4.0	0.08	8.0
		12 24	0	0	0	0	4.0	0.04	0

調査時期			ヨトウムシ類	ハスモンヨトウ		シロイロシヨトウ		材料コガ		ニジュウヤホシテントウ	
年	月	日	被害株率	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 1	26.0	10.0	0.1	0	0	0	0	0	0
		21	24.0	2.0	0.02	0	0	0	0	0	0
		12 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

作物：タマネギ	品種：錦毬	定植：13.12.4
---------	-------	------------

調査時期			白色疫病	べと病	ホトリ根葉枯病	黒点葉枯病	黒斑病	アミミ	アブラムシ類
年	月	日	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	寄生株率
13	12	12	0	0	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0	0	0
14	1	15	0	0	0	0	0	0	0
		31	0	0	0	0	0	10.0	0
		2 19	0	0	0	2.0	0	4.0	0
		3 31	0	12.0	0	0	0	22.0	0

作物：レタス	品種：マイヤー	定植：13.10.3
--------	---------	------------

調査時期			萎黄病	斑点細菌病	腐敗病	軟腐病	灰色かび病	菌核病	すそ枯病	アブラムシ類	
年	月	日	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	株当虫数
13	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 1	0	0	0	0	0	0	0	24.0	3.72
		21	0	0	0	0	0	0	0	14.0	0.42
		12 24	0	0	0	0	2.0	2.0	0	32.0	1.82

調査時期			ウバ類		ハスモンヨトウ		ヨトウガ		タバコガ類	
年	月	日	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	10	15	0	0	8.0	0.08	0	0	2.0	0.02
		11 1	18.0	0.38	20.0	0.24	4.0	0.06	0	0
		21	10.0	0.1	6.0	0.06	10.0	0.1	6.0	0.06
		12 24	2.0	0.02	0	0	0	0	6.0	0.06

作物：トマト	品種：麗容	定植：13.10.1
--------	-------	------------

調査時期			黄化葉巻病	葉かび病	灰色かび病		ハモグリバエ類	コナジラミ類	
年	月	日	発病株率	発病複葉率	発病株率	発病果率	寄生複葉率	寄生複葉率	複葉当虫数
13	10	15	0	0	0	0	0	31.7	9.6
		23	4.8	0	0	0	50.8	33.3	12.0
	11	5	4.8	0	0	0	-	31.7	24.4
		21	33.3	0	0	0	47.1	100	32.3
	12	24	42.9	0	0	0	72.0	100	26.0
	1	31	42.9	0	0	0	60.0	100	44.7
14	2	21	52.4	0	0	0	75.0	100	249.2

調査時期			ヨトウムシ類		タバコガ類	
年	月	日	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	10	15	0	0	0	0
		23	0	0	0	0
	11	5	0	0	0	0
		21	0	0	0	0
	12	24	0	0	0	0
	1	31	0	0	0	0
14	2	21	0	0	0	0

作物：ブロッコリー	品種：しき緑	定植：13.10.3
-----------	--------	------------

調査時期			黒腐病	べと病	コジロア類	ヨカイシロウ		ヨトウガ	
年	月	日	発病株率	寄生株率	寄生株率	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	10	15	0	0	4.0	0	0	0	0
	11	1	0	0	0	0	0	92.0	8.92
		19	0	0	0	0	0	46.0	0.68
		28	0	0	0	0	0	4.0	0.04

調査時期			ハスモンヨトウ		コナガ		オオタバコガ		ウババエ類	
年	月	日	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	10	15	8.0	0.16	0	0	0	0	0	0
		25	2.0	0.02	2.0	0.02	2.0	0.02	0	0
	11	19	2.0	0.02	6.0	0.08	0	0	0	0
		28	0	0	2.0	0.02	2.0	0.02	0	0

調査時期			モンシロチョウ		その他ヨウモリ		ハマダラメイト		アブラムシ類	
年	月	日	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数	寄生株率	株当虫数
13	10	15	0	0	0	0	0	0	18.0	0.42
		25	2.0	0.02	0	0	0	0	16.0	0.3
	11	19	16.0	0.18	0	0	0	0	2.0	0.22
		28	24.0	0.36	0	0	0	0	0	0