

ノリ養殖情報（第23報）

令和8年3月25日

長崎県 島原振興局 県南水産業普及指導センター

TEL:0957-64-0487

- 今年度の調査は、10月中旬から3月下旬までの期間に、陸上調査を17回、海上調査を6回の合計23回予定しています。
- 今回の調査は【陸上】調査です。

1. 調査結果

調査日：3月22日（日） 天候：雨 気温：13.5℃（16:00時点）

（今回（3/22）の水温等の測定時間帯 16:05～17:36） 前回と時間帯が異なるので注意してください。

（前回（3/17）の水温等の測定時間帯 1:20～3:08）

調査点		水温 ℃		比重 σ ₁₅	栄養塩：無機態窒素 μg-at/L		クロロ フィルa値	病害 検鏡結果	
		今回	前回 3月17日	今回	今回	前回 3月17日	今回	アカ	ツボ
1. 神代	支柱	13.7	11.7	20.7	7.2	300.0	23.8		
2. 仲よし下	支柱	13.5	11.4	21.7	16.7	40.7	11.7		
3. 半田	支柱	13.1	11.5	22.7	2.4	179.0	65.1	なし	++
4. 三会	支柱	13.1	11.5	23.4	3.6	78.2	36.2		

※ 栄養塩の期待値は7.0 μg-at/L以上です。

※ アカ、ツボ：なし「なし」、軽度「+」、中度「++」、重症（流出前）「+++」

●主な植物プランクトン（単位：細胞/mL）

植物プランクトン （優占種）	大型珪藻		小型珪藻	
	リゾソレニア属	コシノディスカス属	キートセロス属	ナビキュラ属
1. 神代	5	3		1
2. 仲よし下	4	1		2
3. 半田	9	1		3
4. 三会	7	1	38	2

●調査結果概要

- ・水温は、13.1℃～13.7℃。海水比重(σ₁₅)は、20.7～23.4。
- ・漁場に設置している温度計の3月17日から3月20日までの測定結果は、平均温度は12.0～12.5℃で、昨年より1.7～4.5℃高く推移しました。
- ・栄養塩は、2.4～16.7 μg-at/Lで、4調査点中2点でノリ養殖における期待値7.0 μg-at/Lを上回りました。
- ・クロロフィル量が高い状態が続いています。
- ・壺状菌病は1調査点(目視レベル)で確認されました。
あかぐされ病は確認されませんでした。

2. 赤潮発生状況

- 佐賀県: 赤潮発生なし ユーカンピアが減少傾向 (3月19日)。
- 福岡県: 赤潮発生なし 主な種は珪藻(コシノデイスカス) (3月23日)。
- 熊本県: 赤潮発生なし (3月12日)。

3. 他県の情報

- 佐賀県: アカが7点中6点で確認されました。ツボは確認されませんでした。
色落ちは7点中4点で確認されました。(3月12日)
- 福岡県: 網の撤去作業が進行し、漁場の1割程度で生産が継続されています。
色落ちは2調査点で確認され、軽度が1点、重度が1点でした。
アカは1調査点で確認され、軽度が1点でした。
ツボは確認されませんでした。(3月18日・3月23日)
- 熊本県: 色の回復が見られました。
アカの感染が見られます。ツボは未確認でした。
珪藻プランクトンは、多くの地点で減少していました。
栄養塩は、一部の漁場で回復しています。(3月12日)

4. 本県の情報

- 現在、網の撤去作業が進行しています。
- 色落ちは1調査点中1調査点で見られました(色調低下: 半田)。
- ノリ網の検鏡結果
壺状菌病(目視レベル: 半田)が確認されました。(初認)
あかぐされ病は確認されませんでした。
- 今年度の調査は今回で終了となります。ご協力ありがとうございました。