

事業区分	経常研究(応用)	研究期間	令和3年度～令和6年度	評価区分	事前評価
研究テーマ名 (副題)	タマネギべと病一次伝染の初発時期予測システムとドローン防除技術の開発による省力的防除技術の確立 (タマネギべと病の一次伝染株対策を効率化、省力化する技術の開発)				
主管の機関・科(研究室)名	研究代表者名	農林技術開発センター・病害虫研究室 難波 信行			

<県総合計画等での位置づけ>

長崎県総合計画 チャレンジ2020	基本戦略8:元気で豊かな農林水産業を育てる (3)農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 品目別戦略の再構築
新ながさき農林業・農山村活性化 計画	・収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 - 2 品目別戦略を支える加工・流通・販売対策 品目別戦略を支える革新的新技術の開発

1 研究の概要

べと病の一次伝染株採取作業を効率化する初発時期予測システムの開発および降雨後の薬剤散布が可能で、散布時間も短いドローンを活用した空中散布による一次伝染適期防除技術を確立する。	
研究項目	一次伝染株初発時期の高精度予測技術の開発 ドローンを活用した一次伝染の適期防除技術の確立

2 研究の必要性

1) 社会的・経済的背景及びニーズ 本県では、需要が拡大している加工業務用野菜の産地育成を進めており、なかでもタマネギは県下全域で作付面積が増加している。しかし、近年タマネギべと病が多発傾向にあり、大発生した平成28年は甚大な減収被害が生じた。本病は育苗～本圃栽培初期に土壤中の卵胞子から一次伝染がおこり、一次伝染株からの分生胞子の飛散による二次伝染により発病が拡大する。そのため、一次伝染をいかに抑えるかが対策上の最重要課題である。一次伝染対策として従来より圃場巡回による発病株の早期発見と抜き取りが行われてきたが、一次伝染株は1月下旬～4月上旬まで断続的発生がみられるうえ、初発時期の年次変動が大きく、調査、抜取りの開始時期の判断が困難である。このため、圃場巡回開始の目安を決定するために12月上旬定植のタマネギにおいて一次伝染株初発時期を定植後の積算温度から推定するモデルを作成したが、精度の向上および他の作型での適合性の検証が求められている。 また、薬剤防除については一次伝染を抑制する定植前後の散布体系を確立したが、連日の定植作業あるいは降雨により防除適期に散布できない事例もみられることから、地上散布に比べ散布時間が短く、降雨後の散布が可能な空中散布技術の導入も必要である。
2) 国、他県、市町、民間での実施の状況または実施の可能性 国の地域戦略プロジェクト(平成28年～令和元年)において発生生態と防除対策に関する研究が実施されたが、一次伝染の初発時期予測技術や農薬のドローンによる空中散布に関する研究は行われていない。なお、佐賀県において二次伝染対策に重点をおいた防除技術開発研究が実施されている(平成28年～令和3年)。

3 効率性(研究項目と内容・方法)

研究項目	研究内容・方法	活動指標	R3	R4	R5	R6	単位
1) 初発時期推定モデルの検証と初発時期に影響を及ぼす気象要因の解析	試験実施数	目標	1	1	1	1	試験
		実績					
	2) 定植後の気象による精度の高い初発時期の推定技術の確立	推定技術の改良	目標		1	1	1
実績							
3) 一次伝染株の発生量に影響を及ぼす要因の解析	試験実施数	目標	1	1	1	1	試験
		実績					
1) 登録薬剤(地上散布)のドローン散布(空中散布)による防除効果の検証	試験実施数	目標	1	1			試験
		実績					
2) ドローンを活用した薬剤防除モデルの確立	試験体系数	目標			2	2	体系
		実績					

1) 参加研究機関等の役割分担

佐賀県農業研究センター:防除対策等に関する情報共有・協議

農研機構:気象解析等に関する助言・指導

2) 予算

研究予算 (千円)	計 (千円)	人件費 (千円)	研究費 (千円)	財源			
				国庫	県債	その他	一財
全体予算	35,844	31,900	3,944				3,944
3年度	8,961	7,975	986				986
4年度	8,961	7,975	986				986
5年度	8,961	7,975	986				986
6年度	8,961	7,975	986				986

過去の年度は実績、当該年度は現計予算、次年度以降は案
人件費は職員人件費の単価

(研究開発の途中で見直した事項)

4 有効性

研究 項目	成果指標	目標	実績	R	R	R	R	得られる成果の補足説明等
				3	4	5	6	
	初発時期予測システムの開発	1					1	一次伝染株抜取りの圃場巡回を効率的に開始できる。
	防除適期に散布可能な防除技術の確立	1					1	空中散布により効率的な適期防除が可能となる。

1) 従来技術・先行技術と比較した新規性、優位性

これまでの研究で日平均気温の積算値による「一次伝染株初発時期を推定するモデル」を作成したが、引き続き気象条件の異なるデータを蓄積し、相関が認められる定植後4週間の気温や降雨日数等、その他の気象要因も含めて解析することにより精度を高めた技術とする。また、地上散布で防除効果を確認している「一次伝染を抑制する定植前後の防除体系」を応用した技術としてドローンによる空中散布を組合せることにより適期に防除しやすい技術とする。

なお、これら2技術に関する研究は、他機関で実施されておらず新規性がある。また、これら技術はタマネギ栽培のスマート農業化に向けた技術のアイテムとなる。

2) 成果の普及

研究成果の社会・経済・県民等への還元シナリオ

農林業試験研究部門別検討会において県、JAの指導者へ研究成果を公表するとともに、振興局、農協が開催する研修会、現地検討会等で営農者へ研究成果を報告説明し、技術の普及を推進する。

研究成果による社会・経済・県民等への波及効果(経済効果、県民の生活・環境の質の向上、行政施策への貢献等)の見込み

一次伝染株抜取りの圃場巡回を効率的に開始することが可能となり、無駄な圃場巡回が省略され省力化できる。

防除体系にドローンによる空中散布を組み込むことにより適期防除、散布労力の低減が可能となる。

(研究開発の途中で見直した事項)

種類	自己評価	研究評価委員会
事前	<p>(2年度) 評価結果 (総合評価段階: A)</p> <p>・必要性: A 生産拡大が図られているタマネギにおいて安定生産の最大の障害となるタマネギべと病に対する、より効果の高い防除技術は不可欠なものであり、生産現場からのニーズも高いことから必要性は高い。</p> <p>・効率性: A これまでの研究成果をベースに新たなデータを蓄積し、データの解析と防除技術の応用を進める計画であり、効率的な試験研究の実施が見込まれる。</p> <p>・有効性: A 一次伝染防除対策である一次伝染株抜取り作業や薬剤防除作業の効率化、省力化が可能となり有効性は高い。</p> <p>・総合評価: A 本課題の成果によりタマネギべと病の効率的な防除が可能となり、タマネギの安定生産が図られる。</p>	<p>(2年度) 評価結果 (総合評価段階: A)</p> <p>・必要性: S 長崎県でたまねぎ産地拡大を推進している中、栽培で最大の問題になっているべと病の効果的な防除技術の開発は生産現場からの要望が強く、必要性は極めて高い。</p> <p>・効率性: A これまでの研究で得られた知見をベースに、1次感染防除に着目した研究計画を作成しており、また、佐賀県や農研機構と情報交換を行うなど効率性は高い。</p> <p>・有効性: A 1次伝染発生時期の特定と降雨後の迅速かつ省力的な防除が期待できるドローン活用をターゲットにしており、有効な成果が期待できる。</p> <p>・総合評価: A 本技術の確立により、たまねぎ栽培の安定生産による生産者の所得向上が見込まれるため高く評価できる。ドローンと AI やセンシングを応用した画像解析などによる1次伝染株の発見技術の確立なども検討いただきたい。</p>
	対応	<p>対応</p> <p>ドローンを活用した薬剤防除技術開発を図るとともに AI やセンシングを応用した技術開発について、他機関の情報収集を行いながら取り組みを検討する。</p>
途中	<p>(年度) 評価結果 (総合評価段階:)</p> <p>・必要性</p> <p>・効率性</p> <p>・有効性</p> <p>・総合評価</p>	<p>(年度) 評価結果 (総合評価段階:)</p> <p>・必要性</p> <p>・効率性</p> <p>・有効性</p> <p>・総合評価</p>
事後	<p>(年度) 評価結果 (総合評価段階:)</p> <p>・必要性</p>	<p>(年度) 評価結果 (総合評価段階:)</p> <p>・必要性</p>

後	・効率性 ・有効性 ・総合評価	・効率性 ・有効性 ・総合評価
	対応	対応