

中小型まき網週間漁獲量

令和 5年 8月 3日～ 8月 9日 (旧暦 令和 5年 6月 17日～ 6月 23日)

| 地区 | 主たる魚種組成 | 漁獲量 (ト) | *1日1統当り漁獲量 (ト) | 出漁日数 | 1日1統当り漁獲量 (ト) | |
|------|------------------------------|---------|----------------|------|---------------|----|
| | | | | | 前週 | 前年 |
| 西彼 | | ※ | ※ | ※ | 16 | 8 |
| 五島奈留 | | ※ | ※ | ※ | — | 2 |
| 北松南部 | マイワシ(小羽) 81% マアジ(豆～中) 11% | 525 | 13 | 6 | 16 | 17 |

漁業種類別週間漁獲量

令和 5年 8月 3日～ 8月 9日 (旧暦 令和 5年 6月 17日～ 6月 23日)

| 漁業種類 | 地区 | 主たる魚種 | 大きさ | 漁獲量 (kg) | *1日1統当り漁獲量 (kg) | 出漁日数 | 1日1統当り漁獲量 (kg) | |
|------|------|-------|-----|----------|-----------------|------|----------------|---------|
| | | | | | | | 前週 | 前年 |
| イカ釣 | 対馬東岸 | スルメイカ | | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| | | ケンサキ | 2段 | 8 | 8 | | 59 | 55 |
| | 壱岐勝本 | スルメイカ | | 0 | 0/日 | 3 | 86/日 | 329/日 |
| | | ケンサキ | 3段 | 96 | 32/日 | | 1,225/日 | 3,992/日 |
| | 五島奈留 | ケンサキ | | 0 | 0 | 3 | 23 | 48 |
| 定置網 | 五島有川 | マアジ | | 111 | 9 | 4 | — | 152 |
| | 対馬西岸 | ケンサキ | | 355 | 44 | 4 | 102 | 126 |
| | 対馬東岸 | カマス | | 7,014 | 438 | 6 | 380 | 299 |
| 一本釣 | 北松宇久 | ヒラマサ | | ※ | ※ | ※ | 82/日 | 1/日 |
| | 西彼野母 | マアジ | | — | — | — | 14 | 13 |

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。

*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。




※：詳細不明。

〔海面水温情報〕 MGDSST（人工衛星水温） [気象庁発表] より

令和 5年 8月 3日～ 8月 9日の平均水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

| | 水温 | 前週差 | 平年差 |
|------|---------|--------|--------|
| 対馬東 | 30.0 °C | 1.1 °C | 2.5 °C |
| 五島西沖 | 30.3 °C | 0.9 °C | 2.0 °C |
| 五島灘 | 29.4 °C | 1.0 °C | 1.4 °C |



※各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）

※平年値は過去5年間の平均値。