

ノリ養殖情報（第17報）

令和 7年2月13日

長崎県 島原振興局 県南水産業普及指導センター

TEL:0957-64-0487

- 今年度の調査は、10月中旬から3月下旬までの期間に、陸上調査を17回、海上調査を6回の合計23回予定しています。
- 今回の調査は【海上】調査です。

1. 調査結果

調査日：2月10日(月) 天候：くもり 気温：5.7℃(8:50時点)

(今回(2/10)の水温等の測定時間帯 8:55～10:30)

(前回(2/3)の水温等の測定時間帯 5:55～8:05)

調査点		水温 ℃		比重 σ15	栄養塩：無機態窒素 μg-at/L		クロロ フィルa値	病害 検鏡結果	
		今回	前回 2月3日	今回	今回	前回 2月3日	今回	アカ	ツボ
1. 神代	支柱	7.2	8.1	23.1	1.4	12.2	2.2	++	なし
2. 仲よし下	支柱	8.7	9.5	23.4	2.3	9.4	3.0		
3. 半田	ベタ	9.8	10.1	23.8	0.7	12.4	6.2	なし	なし
4. 三会	ベタ	9.8	10.4	23.7	0.2	8.7	7.0	なし	なし

※ 栄養塩の期待値は7.0 μg-at/L以上です。

※ アカ、ツボ：なし「なし」、軽度「+」、中度「++」、重症(流出前)「+++」

●主な植物プランクトン（単位：細胞/mL）

植物プランクトン (優占種)	小型珪藻			大型珪藻	
	スケルトネマ属	キートセロス属	タシオネマ属	リゾソレニア属	ユーカンピア属
1. 神代	45	38	0	39	8
2. 仲よし下	66	28	0	0	104
3. 半田	159	39	38	0	51
4. 三会	141	63	61	0	440

●調査結果概要

- ・水温は、7.2℃～9.8℃。海水比重(σ15)は、23.1～23.8。
- ・栄養塩は、0.2～2.3 μg-at/Lで、4観測点全てでノリ養殖における期待値7.0 μg-at/Lを下回りました。
- ・あかぐされ病は神代で目視レベルが確認されました。
- ・壺状菌病は確認されませんでした。
- ・大型珪藻のユーカンピア属(最高440細胞/mL)が増加していました。

2. 赤潮発生状況

- 佐賀県:筑後川河口域から白石町地先にかけての海域でユーカンピアによる着色域が確認されました(2月10日)。
- 福岡県:有明海福岡県海域において珪藻のユーカンピアゾディアクスが確認されています(2月10日)。
- 熊本県:熊本市松尾地先から宇土市赤瀬沖にかけて珪藻類(優占種:スケルトネマ属、ユーカンピア属)による赤潮が確認されました(2月5日)。

3. 他県の情報

- 佐賀県:現在、摘採、活性処理が行われています。アカおよびツボは確認されませんでした。色落ちは、20点中18点で確認されました(2月12日)。
- 福岡県:現在、約7割の漁場が行使されています。アカは2調査点で確認され、重度が1点、軽度が1点で、すべて秋芽網でした。ツボは確認されませんでした。色落ちは18調査点で確認され、重度が13点、中度が2点、軽度が3点でした(2月10日)。
- 熊本県:アカの感染が20地点中15地点で確認されました。ツボは未確認です。軽度から重度の色落ちが見られました(2月6日)。

4. 本県の情報

- ベタ漁場と支柱漁場で摘採が行われています。
- 1地点で色調低下が見られました。
- ノリ網の検鏡結果
 - ・3地点中1点であかぐされ病が確認されました。
 - ・付着物は、ベタ漁場で珪藻(リクモフォラ)が多く見られました。
 - ・葉長は27.0~177.1mmの範囲で、平均は39.5~131.2mmでした。