

概ね3ヶ月以内の検査データを記載して下さい。

(該当するものを○でかこむこと)

1 身体計測

身長

cm

体重

kg

2 活動能力の程度

ア 激しい運動をした時だけ息切れがある。

イ 平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上り坂を歩く時に息切れがある。

ウ 息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。

エ 平坦な道を約 100m、あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる。

オ 息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある。

3 胸部エックス線写真所見 (年 月 日)

ア 胸膜癒着 (無・軽度・中等度・高度)

イ 気腫化 (無・軽度・中等度・高度)

ウ 線維化 (無・軽度・中等度・高度)

エ 不透明肺 (無・軽度・中等度・高度)

才 胸郭変形 (無・軽度・中等度・高度)

力 心・縦隔の変形 (無・軽度・中等度・高度)



4 換気機能 (年 月 日) *アについては、下記の予測式を使用して算出すること。

ア 予測肺活量 $\square \cdot \square \square$ L (実測肺活量 $\square \cdot \square \square$ L)

イ 1 秒 量 $\square \cdot \square \square \text{L}$ (実測努力肺活量 $\square \cdot \square \square \text{L}$)

ウ 予測肺活量1秒率 $\square\square \cdot \square \% \left(= \frac{1}{ア} \times 100 \right)$

肺活量予測式 (L)

男性 $0.045 \times \text{身長 (cm)} - 0.023 \times \text{年齢 (歳)} - 2.258$

女性 $0.032 \times \text{身長 (cm)} - 0.018 \times \text{年齢 (歳)} - 1.178$

(予測式の適応年齢は男性 18-91 歳、女性 18-95 歳であり、適応年齢範囲外の症例には使用しないこと。)

5 動脈血ガス (年 月 日) 可能な限り室内空気吸入下で計測のこと

ア O₂分圧: ・ Torr

イ CO₂分圧: ・ Torr

ウ pH : 11.00

エ 採血より分析までに時間を要した場合 〇〇 時間 〇〇 分

オ 耳^だ朶血を用いた場合：〔 〕

*酸素吸入下で計測した場合：採血時の酸素量 リットル／分

動脈血ガス採血時に酸素を外せない理由

6 その他の臨床所見 *指数O₂分圧に不均衡がある場合等、障害等級を判断した理由を、判断の根拠となった他の検査データ等と併せて記載下さい。